

Eligin[®]



Kitl[®]
LIFE SCIENCES

Vyvinut českými vědci.

Vědecká rada projektu Eligin:

- prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 - Přední česká imunoložka a nositelka Ceny Milady Paulové v oblasti klinické medicíny. Coby přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK se zabývá poruchami imunity a z nich vyplývajícími nemocemi. Vede úspěšný výzkum imunoterapie nádorů. A věří, že imunita svojí všudypřítomností v lidském těle stírá hranice mezi klasickou orgánovou medicínou a systémovým pohledem.
- Ing. Milan Houška, CSc. – Výzkumný ústav potravinářský Praha
- prof. Ing. Jan Tříška, CSc. – Ústav výzkumu globální změny AV ČR

zázvor – více než 400 látek



- elicítace
- BIO
- Indonésie

zdroj	6-gingerol (µg/g)	6-shogaol (µg/g)
Čerstvý zázvor - původ Thajsko	79,78	1,13
Čerstvý zázvor - původ Čína	180,36	1,94
Čerstvý bio zázvor - původ Čína	134,25	1,38
Čerstvý bio zázvor - původ Uganda	407,34	5,95
Eligin	8005,169	3867,090

Zdroj: analýza laboratoře Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., leden 2017

Eligin®



120 kapslí / 350 mg
5:1 zázvorový extrakt a vitamín C
enterosolventní kapsle
BIOpotravina
doplněk stravy

- Doporučené dávkování
 - K nespecifickému zvyšování odolnosti organismu dlouhodobě 2-3 kapsle 2x denně.
 - K podpoře imunity při akutních stavech krátkodobě až 12 kapslí denně.
 - Pro potlačení zvracení 2 kapsle 2x denně
- Vyšší dávkování pouze po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Užívat při jídle, zapít dostatečným množstvím vody.
- Upozornění: Kapsle je plně stravitelná a rozpustí se až ve střevech, díky tomu potlačí pálivé účinky extra silného zázvoru. Práškový obsah kapsle lze konzumovat i samostatně.
- Skladujte v chladu a temnu. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Není určeno pro děti do 6 let. Nevhodné při zánětech žaludku. Při žlučnickových kamenech doporučujeme užívání přípravku předem konzultovat s lékařem. Nevhodné pro osoby užívající léčiva proti srážlivosti krve (např. Warfarin). Nepřekračujte doporučenou dávku. Uchovejte mimo dosah dětí. Nemůže být užíváno jako náhrada pestré stravy.
- Nežádoucí účinky: při nedostatečném zapití je možné pociťovat chvilkové pálení v nadbřišku, které odezní během několika minut. U citlivějších osob se může za několik minut po požití dostavit pocit tepla nebo pálení žáhy. Zázvor ani vitamín C se neakumulují v organismu, lze užívat dlouhodobě.

Eligin[®]

Kitl[®]
LIFE SCIENCES